

PROGRAMA DEL SIMPOSIUM SOBRE LO MEJOR DE SAN ANTONIO 2017

Viernes 9 febrero (4pm a 6:30 pm)

Sesión educativa para Radio-Oncólogos (Radioterapia Siglo XXI)

Dra. María Fernanda Díaz Vázquez MD, Argentina

Compartiendo con el profesor/ Cena (6:30 pm)

Dra. Eva Ciruelos MD España

Terapia endocrina adyuvante para mujeres premenopáusicas con cáncer de mama hormon sensible

Buscando la duración óptima del tratamiento endocrino adyuvante en el cáncer de mama

Sábado 10 de febrero

8:00 AM - 9:00 AM Desayuno (Simposio Satélite, Patrocinado por la Industria)

Manejo del Cáncer de Mama Temprano Her2 positivo

Dr. Sunil Verma, MD Canada

9:00 AM -9:10 AM Bienvenida Dr. Kate Lathrop MD USA

9:10 AM- 10: 15 AM Sesión General 1

Ciencia Básica

Dr. Mark E Robson, MD USA

Heterogeneidad intratumoral del cáncer de mama y sus implicaciones clínicas: Manifestaciones e implicaciones de las alteraciones subclonales en cáncer de mama metastásico.

Cáncer de mama lobulillar- Es una enfermedad diferente?

Integración de las variables clínicas como factor predictivo de recurrencia tardía a distancia en pacientes con cáncer de mama RH+ tratadas con 5 años de terapia endocrina.

La prueba de EndoPredict predice la carga tumoral residual posterior a la quimioterapia/terapia endocrina neoadyuvante en mujeres con cáncer de mama RH+/HER2 negativo

10:15AM - 10:30AM Preguntas

An Initiative of

**Encore
Medical
Education**

10:30AM – 10:45 AM Café

10:45AM - 11:30 AM Sesión General 2

Controversias en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama

Dr. Alistar Ring, MD United Kingdom / Dra Claudia Arce, MD México

Dr. Alistar Ring

GS4-02. Comparación aleatoria de un inhibidor de aromatasa adyuvante exemestane (E) más supresión de la función ovárica (OFS) vs Tamoxifeno (T) más OFS en mujeres premenopáusicas con cáncer de mama temprano hormonosensible: Actualización de los estudios TEXT y SOFT.

GS4-03. Comparación aleatoria del Tamoxifeno (T) adyuvante más supresión de la función ovárica (OFS) vs Tamoxifeno en mujeres premenopausicas con cáncer de mama temprano RH+: Actualización del estudio SOFT.

Dra. Claudia Arce

GS3-01. Ensayo clínica fase 3, aleatorizado, prospectivo multicéntrico sobre la adición de 2 o 5 años de Anastrozol después de 5 años de terapia endocrina adyuvante - Resultados de estudio ABCSG-16 que incluyó 3484 mujeres postmenopáusicas.

GS1-03. Tratamiento perioperatorio con Inhibidor de Aromatasa como determinante o predictor de resultado a largo plazo en el cáncer de mama temprano - El estudio POETIC.

GS1-01. Aumentó en la densidad de la dosis de la quimioterapia adyuvante acortando los intervalos entre cursos o la administración secuencial de la droga reducen la recurrencia de la enfermedad y la mortalidad por cáncer de mama: Un metaanálisis de 21 000 mujeres de 16 estudios aleatorizados sanitario.

11:30 AM - 11:45 AM Preguntas

11:45 AM – 12:30 AM

Retos de cáncer de mama avanzado/metastásico RH positivo HER2 negativo (ABC)

Dra. Eva Ciruelos, MD España

GS2-05. Ribociclib de primera línea vs placebo con Goserelina y Tamoxifeno o un Inhibidor de Aromatasa no esterooidal en mujeres premenopáusicas con cáncer de mama avanzado RH+/HER2 negativo: Resultados del estudio fase 3, aleatorizado MONALEESA-7.

GS6-02. Beneficio del amemaciclib en grupos pronósticos: Un análisis exploratorio de la evidencia de los estudios MONARCH 2 y 3

GS2-07. MANTA - Un estudio aleatorizado, fase 2 de Fulvestrant en combinación con un inhibidor mTOR AZD2014 o everolimus vs Fulvestrant sólo en cáncer de mama avanzado/metastásico RH+.

GS5-06. Análisis de los puntos destacados realizado por la FDA sobre mujeres añosas con cáncer de mama metastásico RH+ tratadas con un Inhibidor CDH4/6 como terapia endocrina inicial.

12:30 AM - 12:45 PM Preguntas

12: 45 PM- 2:00PM LUNCH (Simposio Satélite, patrocinado por la industria)
Palbociclib: Actualización de calidad de vida y de eventos adversos de los inhibidores de CDK4/6

Dr. Antonio Llombart Cussac. MD España

Sesión General 3

2:00 PM – 2: 45 PM

Puntos clave del manejo quirúrgico

Dra. Robin Shaw

GS5-01. Metaanálisis sobre márgenes quirúrgicos apropiados en la cirugía conservadora de pacientes con cáncer de mama temprano.

GS5-02. Disección ganglionar axilar vs no disección ganglionar en pacientes con cáncer de mama cT1-T2cN0M0 y sólo micrometástasis en el ganglio centinela; Resultados de 10 años del estudio IBCSG 23-01.

GS5-05. Terapia endocrina primaria para carcinoma ductal in situ (CDIS). CALGB 409303 (Alliance)

2:45 PM - 3:00 PM Preguntas

3: 00 PM – 3: 45 PM

Tratamiento médico para la enfermedad HER2 positiva.

Dr. Sunil Verma, MD Canada

Prueba HER2 - Guías 2017 para la determinación del HER2

GS1-04. Análisis sobre la aberración en el número de copias para predecir respuesta a la terapia neoadyuvante anti-HER2: resultados del estudio fase 3 NEOALTTO.

GS3-04. Estudio aleatorizado fase 3 sobre el trastuzumab adyuvante por 9 semanas vs 1 año, combinado con quimioterapia adyuvante Taxanos-antraciclinas para cáncer de mama temprano HER2 positivo (estudio SOLD)

GS1-02. NSABP B-47 (NRG oncología): Estudio aleatorizado fase 3 que compara quimioterapia adyuvante con adriamicina (A) y Ciclofosfamida (C) seguido de Paclitaxel semanal (WP) o Docetaxel (T) y C con o sin un año de trastuzumab (H) en mujeres con cáncer de mama ganglio positivo o ganglio negativo pero de alto riesgo con expresión HER2 por IHQ 1+ o 2+ y FISH negativo (HER2-bajo IBC)

3:45 PM – 4:00 PM Preguntas

4:00 PM – 4:15 PM Café

4:15 PM – 5:00 PM

Puntos claves del tratamiento con radioterapia: Paradigma de la radiación oncológica.

Dr. Gustavo Adolfo Ferraris, MD Argentina

Irradiación parcial acelerada de la mama: actualización de las guías de consenso ASTRO

Guías de radioterapia post mastectomía.

Avances tecnológicos para optimizar los resultados y minimizar las toxicidades.

Potencial de la radioterapia para convertir el tumor dentro de una vacuna in situ.

5:00 PM – 5:15 PM Preguntas

Cierre / Cocktel